ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ou rebut

n.° 60.

Le memoire que L'Academie m'a chargé d'examiner est de Monsieur Le brun maître en Chirurgie a Vandoeuvre La champagne. Il contient quatre observations dont La premiere a pour objet une tumeur carcinomateuse et variqueuse situé dans Le Colon ou dans Le commencement du rectum, et qui non seulement gênoit beaucoup Le cours des excremens mais produisoit encore une ecoulement considérable de matière sereuse et Sanguinolente et quelque fois de sang tout pur. La malade qui La portoit etoit agée de 24 ans; elle souffroit depuis un an entier Lorsque Monsr Le brun La vit pour La premiere fois, et sa maladie avoit été prise pour un flux hepatique. Elle ne tarda pas à succomber à son malheureux état. L'auteur croit que si dans Le commen-cement on L'eut saignée, et qu'on lui eut fait prendre des remèdes fondans et apéritifs, elle auroit pû guerir. C'est aussi Le jugement qu'il porte sur Le malade dont il donne L'histoire dans La seconde observation. Celui-cy ressentoit depuis plusieurs années des douleurs fort vives dans Le bas ventre depuis L'hypocondre

ARC 56 n° 98

gauche jusqu'à la région iliaque droite. On sentoit dans cet endroit une tumeur grosse comme le poing qui se trouva être par la suite entourée la dernière portion de l'ileon. Les excrémens ne sortoient qu'avec beaucoup de peine et en petite quantité à la fois. Il mourut aussi malgré les fondans, les aperitifs et autres remèdes qui lui furent administrés, et peut être un peu plutôt qu'il n'auroit fait si on l'eut laissé tranquille. Mr Lebrun parle dans sa 3e observation d'une tumeur grosse comme la moitié d'un oeuf de poule, située dans l'épaisseur de la mammelle gauche, dont il fit l'extirpation en se contentant de fendre la peau pour disséquer le tubercule squirreux. La plaie guérit sans suppuration. L'auteur dit qu'un autre chirurgien ayant fait l'extirpation d'une tumeur semblable dans le même tems, et ayant emporté une partie de la mammelle, la plaie fut deux ans ouverte, et conduisit enfin la malade au tombeau. Il ne manque pas d'en tirer avantage en faveur de la méthode qu'il a suivie, et que tous les auteurs

recommandent dans le cas dont il est question. Enfin la quatrième observation roule sur un accouchement laborieuse l'enfant étoit déjà fort avancé, mais la malade étoit en syncope depuis 6 heures lorsque Mr Lebrun fut mandé, et les douleurs avoient entièrement cessé; Mr Lebrun crut devoir se servir d'un crochet pour tirer l'enfant, il y réussit sans l'endommager beaucoup. Il fut cependant obligé de panser pendant quelques jours les ecchymoses et les excoriations que l'action du crochet avoit occasionnées. La mère ne tarda pas à revenir à elle, et guérit assés promptement.

Nous n'avons rien trouvé dans ces quatre observations qui mérite l'attention de l'académie, elles sont fort communes, et ne présentent aucune vue intéressante. C'est pourquoi nous croyons qu'elles ne peuvent entrer dans les mémoires. Ce 20 fevrier 1762

Jard.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE